



Seed Library

Growing Instructions

Beets – Red Ace

CULTURE:

First-rate crops grow quickly in light or loamy soils with a pH over 6.0. In general, cool temperatures produce the best flesh color. Acute weather fluctuations will cause zoning (white rings) in the roots.

DIRECT SEEDING:

Begin early sowings when soil has warmed to 45°F (7°C). Sow 15 seeds/ft. 1/2" deep, rows 12–18" apart. Thin to 1 plant per 3". For a continuous supply of greens and small tender beets, sow seed at 2-week intervals until 8 weeks before regular heavy frosts are expected.

HARVEST AND STORAGE:

Harvest when roots reach desired size, wash, and store bunches up to 10 days at 32°F (0°C).

For more information about Seed Library, visit phoenixpubliclibrary.org or call 602-262-4636 (for TTY dial 7-1-1).



PhoenixPublicLibrary



Seed Library

Instrucciones de Cultivo

Remolacha: Red Ace

CULTIVO:

Los cultivos de primera calidad crecen rápido en los suelos ligeros o margosos con un pH superior a 6.0. En general, las temperaturas frescas producen el mejor color de la pulpa. Las fluctuaciones agudas del clima ocasionarán variaciones en la pigmentación (anillos blancos) de las raíces.

SIEMBRA DIRECTA:

Comience las siembras tempranas cuando el suelo se haya calentado a 45 °F (7 °C). Siembre 15 semillas por pie, a una profundidad de 1/2", en hileras de 12 a 18" de distancia. Realice aclareo para dejar 1 planta cada 3". Para un suministro continuo de hojas y remolachas tiernas pequeñas, siembre la semilla en intervalos de 2 semanas a 8 semanas, antes de que se esperen fuertes heladas de forma regular.

COSECHA Y ALMACENAMIENTO:

Coseche cuando las raíces alcancen el tamaño deseado; lave y almacene los manojos hasta por 10 días a 32 °F (0 °C).

Para más información sobre Seed Library, visite phoenixpubliclibrary.org
o llame al 602-262-4636 (para TTY marque 7-1-1).